

# What You Need To Know About Your Medicine For Tuberculosis (TB):

## Isoniazid (INH) Oral

### About Your Medicine:

ISONIAZID (eye-soe-NYE-a-zid) is an antibiotic used to prevent or treat tuberculosis (TB).

### Before Using This Medicine:

Tell your doctor, nurse, and pharmacist if you:

- Have drug allergies
- Are pregnant or plan to become pregnant
- Are breastfeeding
- Are taking any other prescription medicines
- Are taking over-the-counter medicines (such as cold medicines, pain relievers, vitamins, herbs, etc.)
- Have any other medical problems including diabetes, gout, liver disease, or kidney disease

### Tips to Help You Take Your Medicine:

- Take exactly as directed.
- Do not miss any doses or take two doses at the same time.
- Do not share your medicines with others.
- Keep this and all other medicines out of the reach of children.
- Store in a cool, dry, place away from extreme heat or cold.

[www.scdhec.gov/tb](http://www.scdhec.gov/tb)

### Warnings:

- DO NOT drink alcohol while on this medicine to avoid possible liver problems.
- If you think you have taken an overdose of this medicine, call Poison Control at 1-800-222-1222.

### Possible Side Effects of TB Medicines:

- Upset stomach or stomach pain
- Nausea or vomiting
- Severe weakness or tiredness
- Flu-like symptoms
- Coffee/tea colored urine or light stools
- Yellow eyes or skin
- Rash or itching
- Easily bleeding or bruising
- Blurred vision
- Pain or tingling in hands, feet, or joints
- Dizziness
- Fever

### INH may:

- Cause dizziness
- Cause a tingling sensation or numbness of mouth, hands, and feet



Please contact your DHEC nurse immediately if you experience any of these side effects.

# Những Gì Quý Vị Cần Biết về Thuốc Điều Trị Bệnh Lao (TB) của Quý Vị:

## Isoniazid (INH) Dùng Đường Uống

### Giới Thiệu về Thuốc của Quý Vị:

ISONIAZID (eye-soe-NYE-a-zid) là một loại kháng sinh được sử dụng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh lao (TB).

### Trước Khi Sử Dụng Loại Thuốc Đây:

Hãy cho bác sĩ, y tá, và dược sĩ của quý vị biết nếu quý vị:

- Bị dị ứng thuốc
- Đang mang thai hoặc dự định có thai
- Đang cho con bú
- Đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào khác
- Đang dùng những loại thuốc không theo toa (như thuốc cảm cúm, thuốc giảm đau, vitamin, thảo dược, v.v.)
- Có bất kỳ vấn đề y tế nào khác bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh gout, bệnh gan hoặc bệnh thận

### Lời Khuyên Giúp Quý Vị Dùng Thuốc:

- Dùng đúng theo chỉ dẫn.
- Không bỏ lỡ bất kỳ liều nào hay dùng hai liều cùng một lúc.
- Không chia sẻ thuốc của quý vị với người khác.
- Giữ loại thuốc này và tất cả các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em.
- Bảo quản ở nơi mát mẻ, khô ráo, tránh xa nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh.

[www.scdhec.gov/tb](http://www.scdhec.gov/tb)

### Cảnh báo:

- KHÔNG uống rượu bia trong khi dùng loại thuốc này để tránh các vấn đề gan có thể xảy ra.
- Nếu quý vị cho rằng mình đã dùng loại thuốc này quá liều, hãy gọi cho Bộ Phận Kiểm Soát Chất Độc theo số 1-800-222-1222.

### Tác Dụng Phụ Có Thể Có của Thuốc Điều Trị Bệnh Lao (TB):

- Rối loạn dạ dày hoặc đau dạ dày
- Buồn nôn hoặc nôn mửa
- Rất yếu hoặc mệt mỏi
- Các triệu chứng giống như cúm
- Nước tiểu có màu cà phê/trà hoặc phân có màu nhạt
- Vàng mắt hoặc vàng da
- Phát ban hoặc ngứa
- Dễ chảy máu hoặc bầm tím
- Mờ mắt
- Đau hoặc ngứa ran ở bàn tay, bàn chân, hoặc khớp
- Chóng mặt
- Sốt

### INH có thể:

- Gây chóng mặt
- Gây cảm giác ngứa ran hoặc tê miệng, bàn tay và bàn chân



Hãy liên lạc với y tá DHEC của quý vị ngay lập tức nếu quý vị gặp bất kỳ tác dụng phụ nào trong số này.