

What You Need To Know About Your Medicine For Tuberculosis (TB):

Rifampin (RIF) Oral

About Your Medicine:

RIFAMPIN (rif-AM-pin) is an antibiotic used to treat tuberculosis (TB), usually in combination with one or more other medicines for TB. Rifampin may also be used to treat other infections.

Before Using This Medicine:

Tell your doctor, nurse, and pharmacist if you:

- Have drug allergies
- Are pregnant or plan to become pregnant
- Are breastfeeding
- Are taking any other prescription medicines
- Are taking over-the-counter medicines (such as cold medicines, pain relievers, vitamins, herbs, etc.)
- Have any other medical problems including diabetes, gout, liver disease, or kidney disease

Tips to Help You Take Your Medicine:

- Take exactly as directed.
- Take with a full glass of water on an empty stomach (1 hour before or 2 hours after meals).
- Do not miss a dose or take more than one dose at a time.
- Do not share your medicines with others.
- Keep this and all other medicines out of the reach of children.
- Store in a cool, dry, place away from extreme heat or cold.

www.scdhec.gov/tb



Warnings:

- DO NOT drink alcohol while on this medicine to avoid possible liver problems.
- If you think you have taken an overdose of this medicine, call Poison Control at 1-800-222-1222.

Possible Side Effects of TB Medicines:

- Upset stomach or stomach pain
- Nausea or vomiting
- Severe weakness or tiredness
- Flu-like symptoms
- Coffee/tea colored urine or light stools
- Yellow eyes or skin
- Rash or itching
- Easily bleeding or bruising
- Blurred vision
- Pain or tingling in hands, feet, or joints
- Dizziness
- Fever

RIF may also:

- Interfere with birth control pills/implants and methadone treatment
- Cause urine, sweat, or tears to turn orange
- Permanently stain soft contact lenses
- Cause sensitivity to the sun



Please contact your DHEC nurse immediately if you experience any of these side effects.

Những Gì Quý Vị Cần Biết về Thuốc Điều Trị Bệnh Lao (TB) của Quý Vị:

Rifampin (RIF) Dùng Đường Uống

Giới Thiệu về Thuốc của Quý Vị:

RIFAMPIN (rif-AM-pin) là một loại kháng sinh dùng để điều trị bệnh lao (TB), thường kết hợp với một hoặc nhiều loại thuốc khác để điều trị bệnh lao. Rifampin cũng có thể được sử dụng để điều trị tình trạng nhiễm trùng khác.

Trước Khi Sử Dụng Loại Thuốc này:

Hãy cho bác sĩ, y tá, và dược sĩ của quý vị biết nếu quý vị:

- Bị dị ứng thuốc
- Đang mang thai hoặc dự định có thai
- Đang cho con bú
- Đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào khác
- Đang dùng những loại thuốc không theo toa (như thuốc cảm cúm, thuốc giảm đau, vitamin, thảo dược, v.v.)
- Có bất kỳ vấn đề y tế nào khác bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh gout, bệnh gan hoặc bệnh thận

Lời Khuyên Giúp Quý Vị Dùng Thuốc:

- Dùng đúng theo chỉ dẫn.
- Dùng với một ly nước đầy khi đang đói (1 giờ trước hoặc 2 giờ sau bữa ăn).
- Không bỏ lỡ liều hoặc dùng nhiều hơn một liều cùng một lúc.
- Không chia sẻ thuốc của quý vị với người khác.
- Giữ loại thuốc này và tất cả các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em.
- Bảo quản ở nơi mát mẻ, khô ráo, tránh xa nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh.

www.scdhec.gov/tb



Cảnh báo:

- KHÔNG uống rượu bia trong khi dùng loại thuốc này để tránh các vấn đề gan có thể xảy ra.
- Nếu quý vị cho rằng mình đã dùng loại thuốc này quá liều, hãy gọi cho Bộ Phận Kiểm Soát Chất Độc theo số 1-800-222-1222.

Tác Dụng Phụ Có Thể Có của Thuốc Điều Trị Bệnh Lao (TB):

- Rối loạn dạ dày hoặc đau dạ dày
- Buồn nôn hoặc nôn mửa
- Rất yếu hoặc mệt mỏi
- Các triệu chứng giống như cúm
- Nước tiểu có màu cà phê/trà hoặc phân có màu nhạt
- Vàng mắt hoặc vàng da
- Phát ban hoặc ngứa
- Dễ chảy máu hoặc bầm tím
- Mờ mắt
- Đau hoặc ngứa ran ở bàn tay, bàn chân, hoặc khớp
- Chóng mặt
- Sốt

RIF cũng có thể:

- Ảnh hưởng đến tác dụng của viên thuốc/bộ phận cấy ghép tránh thai và điều trị bằng methadone
- Khiến nước tiểu, mồ hôi hay nước mắt chuyển thành màu cam
- Dây màu vĩnh viễn lên kính áp tròng mềm
- Gây mẫn cảm với ánh nắng mặt trời



Hãy liên lạc với y tá DHEC của quý vị ngay lập tức nếu quý vị gặp bất kỳ tác dụng phụ nào trong số này