

# SCSL Digital Collections

**I got the Mpox Vaccine. Now what? / Me coloqué la vacuna contra la viruela del mono. ¿Y ahora qué?**

Publisher	South Carolina State Library
Rights	Copyright status determined to be in the public domain on April 27, 2020 by United States Supreme Court ruling (Georgia et al., Petitioners v. Public.Resource.Org, Inc. : 590 U.S.___(2020))
Download date	2024-09-19 07:09:22
Link to Item	<a href="https://dc.statelibrary.sc.gov/handle/10827/53783">https://dc.statelibrary.sc.gov/handle/10827/53783</a>

# I got the Mpox Vaccine. Now what?



**It takes weeks for the mpox vaccine to give your body the protection it needs. You aren't immune yet.**

Keep taking actions to protect yourself and others from mpox. If you develop a new rash and you think you have been exposed, please see a health care provider. Let them know you may have been exposed to mpox and that you got vaccinated.

You can **avoid mpox exposures** by playing with partners you trust. However, if you're meeting up for sex with someone new, you should:

1. Ask if they've been ill, had recent rash, or potential exposure recently
2. Ask if they've been vaccinated against mpox
3. Agree to stay in contact with partners in case someone doesn't feel well later

**Mpox spreads through prolonged, direct skin-to-skin contact. Lower your risk by:**

1. Avoiding skin-to-skin contact at crowded events
2. Not touching any rash

DHEC cares about your health and safety. The mpox vaccine is safe, but prolonged itchy redness at the injection site is a common reaction that can be managed with over-the-counter medications.

Two doses of this vaccine are important to building strong immunity against mpox. Please return for your second dose as soon as you're eligible. In the meantime, please avoid exposures to mpox.

**For more information on mpox, please visit:**

[scdhec.gov/MPX](https://scdhec.gov/MPX)

[cdc.gov/monkeypox](https://cdc.gov/monkeypox)



# Me coloqué la vacuna contra la viruela del mono. ¿Y ahora qué?



**La vacuna contra la viruela del mono tarda varias semanas en otorgarle al cuerpo la protección que necesita. Todavía no es inmune.**

Siga tomando precauciones para protegerse a sí mismo y proteger a los demás contra la viruela del mono. Si nota un nuevo sarpullido y cree que estuvo expuesto al virus, consulte con su proveedor de atención médica. Hágale saber que puede haber estado expuesto a la viruela del mono y que se ha colocado la vacuna.

Como medida para **evitar la exposición a la viruela del mono**, tenga relaciones sexuales con personas que sean de confianza. Sin embargo, en caso de tener un encuentro sexual con alguien nuevo, debe hacer lo siguiente:

1. Pregúntele si estuvo enfermo, si tiene un sarpullido reciente o si es posible que haya estado expuesto al virus en el último tiempo.
2. Pregúntele si se vacunó contra la viruela del mono.
3. Acuerden seguir en contacto por si alguno comienza a sentirse mal.

**La viruela del mono se propaga mediante el contacto directo y prolongado de piel con piel. Reduzca el riesgo de contagio mediante las siguientes medidas:**

1. Evite el contacto de piel con piel en eventos masivos.
2. No toque ningún sarpullido.

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (Department of Health and Environmental Control, DHEC) se preocupa por su salud y seguridad. La vacuna contra la viruela del mono es segura, pero es común que provoque picazón y enrojecimiento prolongados en el lugar de la inyección. Estos efectos secundarios se pueden resolver con medicamentos de venta libre.

Es importante colocarse dos dosis de la vacuna para generar una mayor inmunidad contra la viruela del mono. Regrese para recibir la segunda dosis en cuanto sea elegible. Mientras tanto, evite estar expuesto a la viruela del mono.

**Para obtener más información sobre la viruela del mono, visite los siguientes sitios web:**

[scdhec.gov/MPX](https://scdhec.gov/MPX)

[cdc.gov/monkeypox](https://cdc.gov/monkeypox)

