


## ¿Cómo afectará mi período el implante?

- Es posible que con el implante observe cambios en sus períodos o que no tenga períodos. Este tipo de sangrado es normal.
- Solamente 1 de cada 10 mujeres deja de usar el implante debido al sangrado.



## Otros efectos secundarios posibles

Estos efectos secundarios son **raros**:

- cambios de humor
- aumento leve de peso
- dolores de cabeza
- acné
- depresión

## ¿Entre cuáles otros métodos anticonceptivos puedo elegir?

- esterilización
- dispositivo intrauterino (DIU)
- inyección anticonceptiva
- anillo anticonceptivo
- parche anticonceptivo
- píldoras anticonceptivas
- condones
- planificación familiar natural

## ¿Necesita más información?

Comuníquese al departamento local de salud pública.  
[www.scdhec.gov/familyplanning](http://www.scdhec.gov/familyplanning)

### Referencia

Nexplanon (2013). Tomado de  
<http://www.nexplanon-usa.com/en/hcp/index.asp>

*Esta publicación fue posible gracias al subsidio número FPHPA046220-01-00 del Department of Health and Human Services, Office of Population Affairs.*

¿Debería  
escoger un  
**implante?**

## ¿Qué es un implante?


- Es un tubo flexible y pequeño que se inserta en la parte superior del brazo.



- Dura hasta 3 años.
- Contiene una hormona que puede evitar que quede embarazada.
- Su eficacia supera el **99%**, por lo que es probable que no quede embarazada con el implante.
- No tiene que hacer nada para revisar el implante una vez que se lo hayan colocado en el brazo.
- Después de 3 años un proveedor de atención médica tendrá que quitárselo.

## ¿Cómo funciona el implante?

- Evita que el óvulo salga de los ovarios.
- Espesa la mucosa cervical. Esto evita que los espermias lleguen al óvulo.
- Altera la membrana mucosa de la matriz (útero).




## ¿Por qué debería elegir un implante?

- Dura hasta 3 años.
- No tiene que acordarse de nada diariamente, semanalmente ni mensualmente.
- Se coloca en un lugar disimulado del brazo.
- Es muy eficaz.
- Su proveedor puede retirarlo.

## ¿Cómo se inserta el implante?

1. Le ponen un poco de anestésico en el brazo en el que se colocará el implante.
2. El implante se coloca justo debajo de la piel.
3. Le vendan el brazo a presión alrededor del el implante.

La inserción solo toma unos minutos.



*Implante subcutáneo*

*El implante se coloca debajo de la piel del brazo.*