

SCSL Digital Collections

Unahitaji Kufahamu Nini Kuhusu Dawa Zako za Kifua Kikuu (TB) : Rifampin (RIF) Oral

Item Type	Text
Publisher	South Carolina State Library
Rights	Copyright status undetermined. For more information contact, South Carolina State Library, 1500 Senate Street, Columbia, South Carolina 29201.
Download date	2024-08-12 09:55:46
Link to Item	http://hdl.handle.net/10827/30574

Unahitaji Kufahamu Nini Kuhusu Dawa Zako za Kifua Kikuu (TB):

Rifampin (RIF) Oral

Kuhusu Dawa Yako:

RIFAMPIN (rif-AM-pin) ni kiua vijasumu kinachotumika kutibu kifua kikuu (TB), kwa kawaida, kwa kujumuisha pamoja na dawa nyingine moja au zaidi za kifua kikuu. Rifampin inaweza pia kutumika kutibu maambukizi.

Kabla ya Kutumia Dawa Hii:

Mweleze daktari, muuguzi na mfamasia wako iwapo:

- Una mizio na dawa
- Una ujauzito au unapanga kuwa mjamzito
- Unanyonyesha
- Unatumia dawa zingine zozote
- Unatumia dawa za kununua madukani (kama vile dawa za mafua, dawa za kupunguza maumivu, vitamin, miti shamba n.k)
- Una matatizo yoyote ya kitabibu ikiwemo kisukari, jongo, ugonjwa wa ini, au ugonjwa wa figo.

Dondoo za kukusaidia Kutumia Dawa Zako:

- Tumia kama ilivyoelekezwa.
- Tumia na maji yaliyojaa kwenye bilauli tumbo likiwa halina kitu (saa 1 kabla au saa 2 baada ya kula).
- Usipitishie dozi au kutumia zaidi ya dozi moja kwa wakati.
- Usishirikiane dawa zako na wengine.
- Weka dawa hizi na zingine zote mbali na watoto.
- Hifadhi dawa mahali penye tulivu, pakavu na weka mbali na joto au baridi kali.

www.scdhec.gov/tb



Onyo:

- USITUMIE kilevi wakati unapokuwa kwenye matibabu haya ili kuepuka uwezekano wa matatizo ya ini.
- Iwapo unafikiri umezidisha dozi ya dawa hizi, piga simu kwa wadhibiti wa sumu kwa namba 1-800-222-1222.

Madhara ya Kando ya Dawa za Kifua Kikuu yanayoweza kutokea:

- Tumbo kuchafuka au maumivu ya tumbo
- Kichefuchefu au kutapika
- Udhaifu mkali au kuchoka sana
- Dalili za mafua
- Mkojo wenye rangi ya kahawa/ chai au choo kikubwa kilaini
- Macho ya njano au ngozi
- Vipele au kuwashwa
- Kutokwa na damu kirahisi au michubuko
- Uoni hafifu
- Maumivu au kuisimkwa kwenye mikono, miguu na viungo
- Kizunguzungu
- Homa

RIF may also:

- Kuingiliana na dawa za uzazi wa mpango/matibabu ya kupandikiza mbegu na methadoni
- Kusababisha mkojo, jasho au machozi kubadilika rangi na kuwa rangi ya chungwa
- Uharibufu wa lensi laini za kuona
- Kusababisha kuadhiriwa haraka na jua.



Wasiliana na muuguzi wako wa DHEC haraka iwapo utapitia madhara yoyote ya kando kati ya haya.