


Rabia y murciélagos



en Carolina del Sur

Murciélagos con rabia

Porcentajes de animales rabiosos, 2014 - 2019



Mapache	48%
Zorrillo	21%
Zorro	10%
Murciélago	8%
Gato	8%
Perro	2%
Otro Domestico	1.5%
Otro Salvaje	1.5%



¡La mayoría de muertes humanas por rabia en los Estados Unidos, se deben a exposiciones a murciélagos no reportadas!

Cada año, a alrededor de 130 animales se les detecta rabia en South Carolina.

Prevención contra la rabia



Los murciélagos tienen dientes muy pequeños, así que las mordeduras fácilmente pueden ser imperceptibles



Nunca toque un murciélago con las manos descubiertas. Informe a los niños por qué no deberían tomar en sus manos murciélagos u otros animales silvestres.



Vacune las mascotas contra la rabia. Por ley, todos los perros, gatos y hurones deben ser vacunados. Mantenga las vacunas al día, ya sea anualmente o según lo instruya un veterinario.



Evite que los murciélagos entren en las casas u otras edificaciones. Los murciélagos pueden pasar por un orificio tan pequeño como de un cuarto de pulgada por media pulgada, ¡que es casi el tamaño de una moneda de diez centavos!



Si un humano o una mascota estuvieron expuestos, procure capturar todos los murciélagos para hacer pruebas de rabia. Puede encontrar instrucciones para capturar de manera segura a un murciélago en la página de internet de CDC, o pedir asistencia al operador de control de plagas.

Cómo tratar la exposición

Tipos de exposición:

- Contacto directo con un murciélago;
- Encontrar un murciélago donde se ha dejado sin atención a niños, mascotas o personas con trastornos en la capacidad mental;
- Despertarse y encontrar un murciélago en la habitación.

Si ocurre alguna exposición:

1. Lave de inmediato cualquier herida/mordedura con agua y jabón.
2. Contacte a un proveedor de atención médica, incluso si se trata de incidentes menores.
3. Notifique a su Oficina local de Servicios de Salud Ambiental. Visite www.scdhec.gov/ea-regional-offices para encontrar su oficina local.