

What You Need To Know About Your Medicine For Tuberculosis (TB):

Isoniazid (INH) And Rifapentine (RPT)

About Your Medicine:

ISONIAZID (eye-soe-NYE-a-zid) and RIFAPENTINE (rif-a-pen-tine) are antibiotics used in combination to treat tuberculosis (TB) infection.

Before Using This Medicine:

Tell your doctor, nurse, and pharmacist if you:

- Have drug allergies
- Are pregnant or plan to become pregnant
- Are breastfeeding
- Are taking any other prescription medicines
- Are taking over-the-counter medicines (such as cold medicines, pain relievers, vitamins, herbs, etc.)
- Have any other medical problems including diabetes, gout, liver disease, or kidney disease

Tips to Help You Take Your Medicine:

- Take exactly as directed.
- Do not miss any doses or take two doses at the same time.
- Do not share your medicines with others.
- Keep this and all other medicines out of the reach of children.
- Store in a cool, dry, place away from extreme heat or cold.

www.scdhec.gov/tb



Warnings:

- DO NOT drink alcohol while on this medicine to avoid possible liver problems.
- If you think you have taken an overdose of this medicine, call Poison Control at 1-800-222-1222.

Possible Side Effects of TB Medicines:

- Upset stomach or stomach pain
- Nausea or vomiting
- Severe weakness or tiredness
- Flu-like symptoms
- Coffee/tea colored urine or light stools
- Yellow eyes or skin
- Rash or itching
- Easily bleeding or bruising
- Blurred vision
- Pain or tingling in hands, feet, or joints
- Dizziness
- Fever

INH may occasionally cause:

- Dizziness
- A tingling sensation or numbness of mouth, hands, and feet

RPT may:

- Interfere with birth control pills/implants and methadone treatment
- Cause urine, sweat, or tears to turn orange
- Permanently stain soft contact lenses
- Cause sensitivity to the sun



Please contact your DHEC nurse immediately if you experience any of these side effects.

သင့်၏ (TB) အဆုတ်ရောဂါဖို့ ဆေးက သိထားရန်ဘာလို့လဲ။

Isoniazid (INH) And Rifapentine (RPT)

သင့်ဆေးအဖော်ကား။

ISONIAZID (eye-soe-NYE-a-zid) နှင့် RIFAPENTINE (rif-a-pen-tine) သည် အဆုတ်ရောဂါ (TB) ကုသပေးရန်အတွက် အဆုတ်ရောဂါ (TB) စင်္ကြာပုရွေးခင်းကုသရန်အတွက် ပြုစုပေးသည်။

ဤဆေး အသုံးပြုပုံစံ။

သင့်၏ ဆရာဝန်၊ သူ့နာမည်ဆရာမ နှင့် ဆေးပညာရှင်များက ပြောပြပါ အကယ့်ပုံစံမှာ။

- ဆေးပွင့် မတည့် ခဲသွား။
- ကိုယ်ဝန်ရှိ(သူ) ကိုယ်ဝန်စီမံကိန်းခွဲသွား။
- မိခင်က ကလေးရှိပုံစံခဲသွား။
- ဆရာဝန်ပေးသော ဆေးလက်မှတ်ပွင့် ဆေးသောက်ခဲသွား။
- ခုန့်မှတ်သော ဆေးပုံစံသည် (ခော်ကုဆေး၊ နာကုသကုသဆေး၊ အားဆေး၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပြုစုပေးသည်။)
- တျားသော ကန်းမာရောဂါပုံစံသည် ဆီးခိုရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ အသားရောဂါ၊ ကော်ကုကပုရောဂါ ပြုစုပေးသည်။

သင့်ဆေးသောက်ရန် အသက်ပေးပေးခြင်း။

- အညွှန်းအတိုင်း သောက်ပါ။
- ကော်သက်ခြင်း (သူ) ပွဲခါစာကုတ်စားခြင်း သောက်ခြင်း ပြုပါ။
- သင့်ဆေးကိုတျားသွင်း ဝေငွေသောက်ခြင်း ပြုပါ။
- ဤဆေးပွင့် တျားသော ဆေးများကိုကလေးမယူမီသောနေ့ကုသိမ်းထားပါ။
- အေးချမ်း ရေခဲသေတ္တာပေး မပူလှမ်းမအေးလှမ်းသောနေရာကို သိမ်းထားပါ။

www.scdhec.gov/tb



သတိပေးချက်များ။

- ဤဆေးသောက်နေခိုက်တွင် အသားပျက်စေပေးသော အရက်သောက်ခြင်း မပြုပါ။
- အကယ့်ဤဆေးကိုအသုံးပြုသည့် သင့်ထံသို့ အဆီပျော်ထိန်းသိမ်းရန် ဤဖုန်းနံပါတ် 1-800-222-1222 ဆက်ပါ။

ဆီမီးသက်ရောက်မှု (TB) ဆေးများ။

- ဝမ်းဗိုက်အပင် (သူ) ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု။
- မူးယစ်စွမ်း (သူ) ပိုမိုအနံ့ထွက်မှု။
- အားနည်းခြင်း (သူ) ပင်ပန်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- တုတ်ကေးပြင်သလိကရုဏ်းရှိပါသည်။
- မစင်သေးသော ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည် အရော့ငှါပါသည်။
- မိကလ်နှင့် အရေပြားက အဝါရောင်ရှိပါသည်။
- ရမ်းနည်း (သူ) အဖုတ်ပွင့်ပုံစံရှိပါသည်။
- အလပြုတကူ သေကြေခြင်း (သူ) ညီမည်းရောင်ကုန်ပါသည်။
- မိကစီ မီးခိုးရှိပါသည်။
- ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချေလက် (သူ) အဆုတ်နာကျင်မှု နာကျင်မှု။
- မူးဝင်ခြင်းရှိပါသည်။
- ကိုယ်ပျက်ခြင်းရှိပါသည်။

INH ပြုစုပေးသော အဖော်ကားများ။

- မူးဝင်ခြင်း ပြုစုပေးခြင်း။
- ခံမားစေရန် ပြုစုပေးခြင်း (သူ) ပါစပု၊ ရေခဲ၊ လက် ဖုံးခြင်း ပြုစုပေးခြင်း။

RPT ပြုစုပေးသည့် က။

- သန့်ရှင်းသော ဆေးပေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော အပူပေးခြင်း ကုသပေးခြင်း ပြုစုပေးခြင်း။
- ဆီးရေ၊ ခဲ (သူ) မိကရည်များ အဝါရောင်ထွက်ခြင်း။
- အခါခါ ဖော်ပေးသော အရောင် မွန်ဘီလူးကုန်ပါ။
- နေရောင်ခြည်ကို လှောင်ကာ ထားခြင်း ခံစားရပါသည်။



အကယ့်ဤ ဤသို့ ခို ကို ခံစားမိမ်းသင့်ခံ စားရပါက သင့်၏ DHEC ဆရာမကို ခံစားခင်းဆက်သပြောပါ။